
CONSEIL SCIENTIFIQUE

Jeudi 24 juin 2004

Recommandations pour la pratique clinique sur le thème : « Prévention et Prise en charge de l'hémorragie du post-partum immédiat »

Demandeur : DGS (Mme Patureau) et le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français.

Contexte de la demande

La diminution du taux de mortalité maternelle est un objectif majeur de santé publique. L'hémorragie du post-partum est la première cause de mortalité maternelle en France devant l'éclampsie et les embolies amniotiques.

Le comité national d'experts sur la mortalité maternelle a émis un rapport en 2002, dans lequel il souligne qu'une grande majorité des décès par hémorragie aurait pu être évitée. Les principales causes de décès identifiées sont un traitement inadéquat, souvent associé à un délai de diagnostic et d'intervention trop long. Il apparaît donc nécessaire de proposer des recommandations pratiques pour la prévention et la prise en charge de l'hémorragie du post-partum immédiat.

Date du Comité d'organisation : 18 Mars 2004

Sociétés savantes et organisations professionnelles contactées

1. Ayant participé au comité d'organisation

Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français

Société Française d'Anesthésie Réanimation

Collège National des Sages-Femmes

Société Française de Radiologie

Par ailleurs, un représentant de la DGS a assisté au comité d'organisation.

2. N'ayant pas répondu à la demande de participation au comité d'organisation

L'Etablissement Français du Sang

Membres de l'Anaes :

Patrice Dosquet, Responsable du service des Recommandations Professionnelles

Christine REVEL, Chef de projet, Service des Recommandations Professionnelles

Questions et orientations pour le groupe de travail

1. Importance du problème :

Fréquence, conséquences en terme de santé, facteurs de risque avant l'accouchement.

2. Prise en charge anténatale : la gestion du risque.

Indication à un traitement préventif par fer durant la grossesse, autotransfusion, indications du transfert maternel vers une structure spécialisée (transfert in utero), ...

3. Facteurs de risque au cours du travail et prévention clinique et pharmacologique de

L'hémorragie du post-partum immédiat au moment de l'accouchement

4. **Prise en charge obstétricale initiale en cas d'hémorragie du post-partum immédiat**
5. **Prise en charge initiale par l'anesthésiste en cas d'hémorragie du post-partum immédiat**
6. **Prise en charge obstétricale en cas d'hémorragie du post-partum immédiat qui persiste ou qui s'aggrave malgré les mesures initiales**
7. **Prise en charge par l'anesthésiste en cas d'hémorragie du post-partum immédiat qui persiste ou qui s'aggrave malgré les mesures initiales**
8. **Modalités d'un transfert maternel dans le cadre d'une hémorragie du post-partum immédiat**
9. **Indications et techniques de l'embolisation artérielle**
10. **Indications et techniques de la chirurgie**
11. **Gestion des produits dérivés sanguins dans le cadre de l'hémorragie du post-partum immédiat**

Cette recommandation est réalisée par le Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français, dans le cadre d'un partenariat avec l'ANAES.

Les questions émises par le Comité d'Organisations seront réparties entre plusieurs experts membres du Groupe de Travail, chaque expert assurant l'analyse de la littérature et la rédaction de l'argumentaire relative à sa/ses question(s).

Composition du groupe de travail

Le groupe de travail pourra être composé de :

- Gynécologue-obstétriciens
- Anesthésistes-Réanimateurs
- Sages-Femmes
- Radiologues
- Biologistes spécialisé en Hémostase
- Représentants de l'Etablissement Français du sang

Composition du groupe de lecture proposé par le comité d'organisation

Le groupe de lecture pourra être constitué par des membres des spécialités suivantes, en plus des catégories professionnelles déjà représentées dans le groupe de travail. :

- Représentants des Urgentistes (SAMU)
- Représentants de Centre d'Hémovigilance

Cibles des recommandations

Ces recommandations sont destinées à tous les professionnels qui participent à la prise en charge

de la patiente au moment de l'accouchement (sage-femme, gynécologue-obstétricien, anesthésiste-réanimateur) ou dont l'intervention peut être requise en cas de complications de l'accouchement (radiologue, biologiste, banque du sang).